



## Welke medicatie dien ik te stoppen voor een ingreep ?

### Kleine ingreep (onder lokale verdoving)

- **Bloedverduunners** Antiaggregantia (Asaflow, Brilique, Clopidogrel, Plavix): 5 dagen voordien te stoppen, hervatten twee dagen na de ingreep.  
(Nieuwe) anticoagulantia (Xarelto, Eliquis, Lixiana): 2 dagen voordien te stoppen, hervatten twee dagen na de ingreep.  
(Oude) anticoagulantia (Sintrom, Marevan, Marcoumar): 5 dagen voordien te stoppen en de nood aan overbruggingsantistolling (Fraxiparine) te **bespreken met de huisarts of voorschrijvend specialist**.
- **Supplementen** Sint-Jans kruid, Valeriaan, vitamine E, Ginko Biloba, look, Ginseng, rode rijst, Omega 3, Ephedra, ... : inname minstens 1 week op voorhand stoppen.

### Grote ingreep (onder algemene verdoving) – Medicatie inname wordt eveneens besproken met de anesthesist op de preoperatieve raadpleging. Neem daarom steeds uw volledige medicatielijst mee.

- **Bloedverduunners** Antiaggregantia (Asaflow, Brilique, Clopidogrel, Plavix): 5 dagen voordien te stoppen, hervatting afhankelijk van ingreep.  
(Nieuwe) anticoagulantia (Xarelto, Eliquis, Lixiana): 2 dagen voordien te stoppen, hervatting afhankelijk van ingreep.  
(Oude) anticoagulantia (Sintrom, Marevan, Marcoumar) 5 dagen voordien te stoppen en de nood aan overbruggingsantistolling (Fraxiparine) te **bespreken met de huisarts of voorschrijvend specialist**.
- **Diabetes medicatie** Metformine : te stoppen 48u voor de ingreep.  
Insuline therapie: schema zal opgestart worden bij opname.  
Andere: laatste inname de dag voordien.
- **Immunomodulatoren** (Imuran, Tacrolimus, Ledertrexaat, ...): 2 weken op voorhand stoppen indien mogelijk.
- **Supplementen** Sint-Jans kruid, Valeriaan, vitamine E, Ginko Biloba, look, Ginseng, rode rijst, Omega 3, Ephedra, ... : inname minstens 1 week op voorhand stoppen.
- **Diuretica** Laatste inname de dag voordien (uitz: chronisch hartfalen, sterk verminderde ventrikelfunctie).
- **Medicate voor het centraal zenuwstelsel** TCA, SSRI's, lithium, antipsychotica, neuroleptica, ... : laatste inname de dag voordien. MAO-inhibitoren (Fenelzine): drie weken op voorhand stoppen.
- **NSAID's (onderhoudstherapie)** Laatste inname de dag voordien.  
Uitz: langwerkende (Arcoxia, Feldene, Brexine, Meloxicam, Naproxen, Piroxicam,...): > 3 dagen op voorhand te stoppen.

**Indien er twijfel bestaat over het onderbreken van uw medicatie, gelieve dan steeds contact op te nemen met uw huisarts of voorschrijvend specialist.**

**Bij problemen of vragen : neem gerust contact op met ons via telefoon of email.**

Dr Bob De Frene	bob@defrene.be
Secretariaat	secretariaat@defrene.be
Jan Yperman ZH Ieper	057/ 35.75.10
AZ West Veurne	058/ 33.35.59
aclinic Brugge	050/ 96.98.20